

# Исследование Герпферон

## Исследование терапевтической эффективности препарата «Герпферон, мазь»

В апреле-июле 2003 года на базе Нижегородской ГМА и Саратовском ГМУ прошли клинические исследования терапевтической эффективности мази «Герпферон». Руководители исследований: зав. кафедрой общей и клинической фармакологии НГМА, д.м.н., профессор В. Б. Кузин и зав. кафедрой госпитальной терапии лечебного факультета СГМУ д.м.н., профессор А. П. Ребров.

В общей сложности в исследованиях приняло участие 120 человек от 18 до 60 лет с герпетической инфекцией (Herpes Simplex 1,2 типа и опоясывающий лишай — Herpes Zoster). Методом рандомизации больные были разделены на основную и контрольную группы. В опытной группе применялся препарат «Герпферон», в контрольной — мазь ацикловир, 5%.

В исследуемых группах наилучшие результаты были зарегистрированы у больных с генитальным герпесом. Достоверное выздоровление уже на пятые сутки наблюдалось у 85% человек в опытной группе и лишь у 29% в контрольной группе ( $P < 0,05$ ). У пациентов, получавших герпферон, продолжительность местной негативной симптоматики (боли и жара в месте воспаления, напряжения и зуда, покраснения, припухлости) была достоверно меньше. В более ранние сроки у них исчезала сыпь, мелкие эрозии, быстрее происходило заживление.

У больных с герпетическими поражениями кожи и слизистых лица использование мази герпферон оказалось достоверно более эффективным. У пациентов, получавших «Герпферон», наблюдалось сокращение продолжительности местных проявлений заболевания: изъязвления, покраснение, припухлость, боль и жжение в месте воспаления, чувство распирания и зуда кожи.

У наблюдаемой группы с Herpes Zoster выздоровление уже на пятые сутки зарегистрировано у 92% пациентов, получавших «Герпферон», и у 77% пациентов контрольной группы. У больных с опоясывающим лишаем, леченных герпфероном, наблюдалось достоверно значительно более раннее исчезновение болевых ощущений, жжения и зуда. Это чрезвычайно важно для данной категории пациентов, страдающих от сильных болевых ощущений.

## Выводы

Таким образом, препарат «Герпферон» оказался эффективным для лечения герпетических поражений кожи и слизистых оболочек, вызванных вирусом простого герпеса Herpes Simplex (1 и 2 типа) и вирусом опоясывающего лишая (Herpes Zoster). Его терапевтическая эффективность оказалась более высокой, чем у препарата сравнения (мазь ацикловир, 5%). У пациентов, применявших герпферон, было зарегистрировано более раннее заживление поражений и исчезновение болевых ощущений, сокращалась общая продолжительность заболевания.